



ที่ ปจ ๗๒๙๐๔/ว ๑๕๔

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
ถนนสายทุ่งโพธิ์-เขาขาด ปจ ๒๕๒๒๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธโรคไข้มาลาเรีย

เรียน กำนันตำบลแก่งดินสอ/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภา อบต./ประธาน อสม.ตำบลแก่งดินสอ/ประธานประชาคม
หมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับประชาสัมพันธฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ได้เห็นความสำคัญ
เรื่องโรคไข้มาลาเรีย เพราะช่วงนี้กำลังจะเข้าหน้าฝน และในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอบางพื้นที่เป็นป่าชื้นทำให้อาจมียุง
ที่เป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรียมาสู่คนได้

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ จึงขอความร่วมมือ
ท่านประชาสัมพันธแผ่นพับโรคไข้มาลาเรียให้ประชาชนได้รับทราบและรู้จักป้องกันและเฝ้าระวังตนเอง รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำราญ อ่อนอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานส่งเสริมสุขภาพ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๐๖๑๖ ต่อ ๑๑

การป้องกัน

1. เนื่องจากไม่มีวัคซีนและไม่มียากินเพื่อป้องกันการเกิดโรค ดังนั้นหากต้องเข้าป่าหรือไปในพื้นที่เสี่ยงควรป้องกันตนเองดังนี้
2. สวมใส่เสื้อผ้าปกคลุมแขนขาให้มิดชิด
3. ใช้ยาทากันยุงหรือจุดยากันยุง
4. นอนในมุ้งชุบน้ำยาทุกคืน
5. ใช้มุ้งชุบน้ำยากลุ่มเปลเวลาต้องไปค้างคืนในไร่นาป่าเขา



ความชุกชุมของโรค

ส่วนมากบริเวณที่เป็นป่าเขาและมีแหล่งน้ำ ปัจจุบันเป็นโรคประจำถิ่นที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน

การกำจัดโรคไข้มาลาเรีย

กำจัดโรคไข้มาลาเรีย หมายถึง การดำเนินงาน กำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียไม่ให้เกิดขึ้นใน ท้องที่ใดๆ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ไม่ให้มี ผู้ป่วยมาลาเรีย หรือต้องกำจัดยุงพาหะนำเชื้อ มาลาเรียให้หมดไปจากท้องที่นั้น แต่เป็นการ ดำเนินงานให้ท้องที่ปลอดโรคไข้มาลาเรียโดย ไม่มีผู้มีเชื้อมาลาเรียในกระแสเลือดที่ได้รับเชื้อ มาลาเรียจากในพื้นที่นั้นๆ แต่ถ้ามีผู้ป่วย มาลาเรียเข้ามา จะต้องมีมาตรการค้นหา สกัด กั้นและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้ออย่าง ต่อเนื่อง



ด้วยความห่วงใยจาก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
โทรศัพท์ / โทรสาร 037-210616
E-mail : admin@kaengdinso.go.th



โรคไข้มาลาเรีย



จัดทำโดย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

โรคไข้มาลาเรีย

โรคไข้มาลาเรีย เป็นโรคติดต่อที่มียุงก้นปล่องบางชนิดเป็นพาหะ เกิดจากเชื้อโปรโตซัวพลาสโมเดียม ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่อาศัยในเลือด มีวงจรของเชื้อระยะต่างๆ สลับกัน คือระยะมีเพศและไม่มีเพศ และมีวงจรชีวิตอยู่ในสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์จำพวกยุง

ยุงก้นปล่อง

ยุงก้นปล่อง เป็นแมลงชนิดหนึ่ง มีปากคล้ายวงยื่นยาวออกไปข้างหน้า มักยกส่วนท้องขึ้นสูงเป็นปล่องอย่างเห็นได้ชัดในขณะดูดเลือด ยุงก้นปล่องอาศัยได้หลายที่ เช่น บ้านเรือน ป่า ภูเขา จึงพบมากในชนบทที่อยู่แถวชายป่า ชอบวางไข่ในแหล่งน้ำใสไหลริน แอ่งน้ำสะอาด ธารน้ำไหล หรือน้ำตกลูกชนิดนี้ชอบกัดคนในเวลาพลบค่ำ ตอนดึก และเช้ามืด

เชื้อมาลาเรีย

เชื้อมาลาเรียในคนสำหรับประเทศไทยมีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่

1. *Plasmodium falciparum* (Pf)
2. *Plasmodium vivax* (Pv)
3. *Plasmodium malariae* (Pm)
4. *Plasmodium ovale* (Po)
5. *Plasmodium knowlesi* (Pk)

การติดต่อ

สาเหตุหลักคือยุงก้นปล่องที่มีเชื้อกัด ส่วนสาเหตุอื่นๆ ที่อาจพบได้ เช่น จากแม่ที่ป่วยเป็นไข้มาลาเรียสู่ลูกในครรภ์ การถ่ายโลหิต เป็นต้น เมื่อยุงก้นปล่องตัวเมียกัดผู้ป่วยที่มีเชื้อไข้มาลาเรีย เชื้อจะอยู่ในตัวยุงประมาณ 10-12 วัน เมื่อยุงนั้นไปกัดคนอื่นต่อก็จะปล่อยเชื้อมาลาเรียจากต่อมน้ำลายเข้าสู่คน จึงทำให้คนที่ถูกยุงกัดเป็นไข้มาลาเรียต่อไป

อาการ

โดยทั่วไปอาการเริ่มแรกของไข้มาลาเรียจะเกิดขึ้นหลังจากถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อกัดประมาณ 10-14 วัน โดยจะจับไข้ไม่เป็นเวลา ไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว และกล้ามเนื้อ อาจมีอาการคลื่นไส้และเบื่ออาหารได้ หลังจากนั้นจะจับไข้เป็นเวลา มีอาการหนาวๆ ร้อนๆ เหงื่อออก ผู้ป่วยจะอ่อนเพลียและเหนื่อย



การตรวจรักษา

เมื่อสงสัยเป็นไข้มาลาเรียให้เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล หรือมาลาเรียคลินิกใกล้บ้าน ซึ่งมีขั้นตอนคือการเจาะเลือดหาเชื้อ หากพบเชื้อจะได้รับยา โดยการกินยาต้องกินให้ครบตามแพทย์สั่ง และต้องมาตรวจเลือดซ้ำตามแพทย์นัด